



Montevideo, viernes 19 de septiembre de 2008.

PRONOSTICO FITOSANITARIO EN FRUTALES DE HOJA CADUCA

BOLETIN N° 3

GUSANO DEL DURAZNO Y MEMBRILLERO (Cydia molesta)

Se comunica a los Sres. usuarios del Servicio de Pronósticos Fitosanitarios que el **jueves 4 de septiembre** se han registrado altas capturas de machos en trampas de feromonas, correspondientes al primer pico de vuelo de la generación invernante de grafolita, por lo cual se prevé el correspondiente pico de emergencia de larvas a partir del próximo **martes 23 de septiembre.**

De acuerdo a las distintas estrategias de manejo a utilizar en sus montes, evalúe la oportunidad o no de realizar un tratamiento.

Sr. Productor, considere la presencia de abejas para definir el momento y producto a utilizar en este tratamiento.

Para un uso racional de esta información, consulte a su técnico asesor.

Cálculo de los grado día.

Se utiliza como modelo de cálculo el algoritmo del seno con corte horizontal siendo los valores de umbral los presentados en el siguiente cuadro:

Insecto	Umbrales en ° C		GDA necesarios entre pico de vuelo y emergencia de larvas.
	Inferior	Superior	
Cydia molesta (grafolita)	7,2	32,2	107
Cydia pomonella (carpocapsa)	10,0	31,5	89